

QUIZZ PORT DE GANTS



Question 1 (plusieurs réponses possibles)

Quelles sont les consignes à respecter pour le port de gants à usage unique :

- ☐ Mettre les gants sur des mains correctement séchées
- ☐ Mettre des gants lorsque les mains sont lésées
- ☐ Pratiquer une hygiène des mains après les avoir quittés
- ☐ Pratiquer une hygiène des mains avant de les mettre

Question 2 (plusieurs réponses possibles)

Pour quel(s) type(s) d'activités, le port de gants est attendu :

- ☐ Change des protections d'un patient
- ☐ Ablation d'un pansement
- ☐ Vidange d'une poche à urines
- ☐ Aide à la mobilisation
- ☐ Aspiration trachéale
- ☐ Effleurage pour prévention d'escarre
- ☐ Transport d'un bassin souillé
- ☐ Réalisation d'un soin de bouche au doigt

Question 3

Je mets des gants en systématique pour toute manipulation d'aiguille ou d'objets coupants (rasoirs...)

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Je porte des gants pour changer des draps souillés par des liquides biologiques :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Je vide la poche à urine d'un patient puis je réalise sa toilette avec la même paire de gants :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 6

Le port systématique de gants lors des soins permet de limiter le risque de contamination :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 7

Je porte des gants pour essuyer une surface souillée par du sang :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 8

Une IDE doit réaliser la pose d'un cathéter puis la réfection d'un pansement chez un patient. Elle conserve la même paire de gants.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 9

Je dois porter des gants pour toute la toilette d'un patient :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 10 (plusieurs réponses possibles)

Il faut avoir des gants à disposition :

- ☐ Dans les poches
- ☐ Sur le chariot de soin
- ☐ Dans la chambre
- ☐ Dans les cabinets de toilette des patients

RÉPONSES AU QUIZZ

PORT DE GANTS



Question 1 (plusieurs réponses possibles)

Quelles sont les consignes à respecter pour le port de gants à usage unique :

- ☒ Mettre les gants sur des mains correctement séchées
- ☒ Mettre des gants lorsque les mains sont lésées
- ☒ Pratiquer une hygiène des mains après les avoir quittés
- ☒ Pratiquer une hygiène des mains avant de les mettre

« Attendre que les mains soient parfaitement sèches avant d'enfiler les gants. » SF2H Recommandations pour l'hygiène des mains juin 2009.

Porter des gants uniquement :

- Lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées. R12

Une friction hydroalcoolique des mains est réalisée avant le port de tout EPI afin d'éviter leur contamination. Le niveau initial de contamination des mains est majoré sous les gants par la chaleur et l'humidité. Au retrait, pratiquer une hygiène des mains. P 36 de l'argumentaire.

Question 2 (plusieurs réponses possibles)

Pour quel(s) type(s) d'activités, le port de gants est attendu :

- ☒ Change des protections d'un patient
- ☒ Ablation d'un pansement
- ☒ Vidange d'une poche à urines
- ☐ Aide à la mobilisation
- ☒ Aspiration trachéale
- ☐ Effleurage pour prévention d'escarre
- ☒ Transport d'un bassin souillé
- ☒ Réalisation d'un soin de bouche au doigt

Les équipements de protection individuelle (EPI) désignent les mesures barrières suivantes : port de gants, protection du visage (masque/lunettes), protection de la tenue. Utilisés seuls ou en association, les EPI protègent les professionnels de santé du risque d'exposition à des microorganismes :

- Lors des contacts avec les muqueuses, la peau lésée,
- En cas de contact ou risque de contact/ projection/aérosolisation de produit biologique d'origine humaine. R11

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée,
- Lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées. R12

Question 3

Je mets des gants en systématique pour toute manipulation d'aiguille ou d'objets coupants (rasoirs...)

- ☐ Vrai
☒ Faux

Pour les soins utilisant un objet perforant :

- Porter des gants de soins [...] R23

Ne pas porter de gants pour la réalisation de :

- Injections intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, y compris lors de pose de perfusion sous-cutanée sauf si la peau du professionnel ou du patient est lésée. SF2H, « Avis relatif à l'évaluation de l'intérêt du port de gants lors de la réalisation des injections intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques », 16/04/2024.

Question 4

Je porte des gants pour changer des draps souillés par des liquides biologiques :

- ☒ Vrai
☐ Faux

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée, [...] R12

Question 5

Je vide la poche à urine d'un patient puis je réalise sa toilette avec la même paire de gants :

- ☐ Vrai
☒ Faux

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée, [...] R12
- Changer de gants :
 - Entre deux patients,
 - Pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre. R14

Question 6

Le port systématique de gants lors des soins permet de limiter le risque de contamination :

- ☐ Vrai
☒ Faux

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée,
- Lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées. R12

Changer de gants :

- Entre deux patients,
- Pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre. R14

Le port continu de gants favorise la transmission croisée de micro-organismes en empêchant le change de gants et la réalisation d'une hygiène des mains.

Question 7

Je porte des gants pour essuyer une surface souillée par du sang :

- ☒ Vrai
☐ Faux

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée, [...] R12

Question 8

Une IDE doit réaliser la pose d'un cathéter puis la réfection d'un pansement chez un patient. Elle conserve la même paire de gants.

- ☐ Vrai
☒ Faux

Changer de gants :

- [...]
- Pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre. R14

Question 9

Je dois porter des gants pour toute la toilette d'un patient :

- ☐ Vrai
☒ Faux

Porter des gants uniquement :

- En cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée, [...] R12

Mettre les gants juste avant le geste. Retirer les gants et les jeter immédiatement après la fin du geste. R13

Changer de gants :

- Entre deux patients,
- Pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre.

Commentaire : Les soins sur peau saine s'effectuent sans gant. [...]

Ne pas réutiliser les gants. R14

Question 10 (plusieurs réponses possibles)

Il faut avoir des gants à disposition :

- ☐ Dans les poches
☒ Sur le chariot de soin
☒ Dans la chambre
☐ Dans les cabinets de toilette des patients.

Porter des équipements de protection individuelle de manière adaptée (port de gants de soins, protection de la tenue) et respecter l'hygiène des mains lors de la gestion des excreta (urines, selles, vomissures). R27

Commentaire R28 : La gestion des excreta comprend tous les soins en rapport avec leur manipulation (toilette, changes, prélèvement, élimination, ainsi que l'entretien des contenants : urinal, bassin, seau, bocal...).

Afin de maintenir leur condition de propreté, les gants doivent rester dans leur conditionnement d'origine. Argumentaire des PS Page 36

Ils doivent être mis à disposition au plus près du soin sans multiplier les points de stockage (sur le chariot de soins).